

19- VASECTOMIA E AS INTERCORRÊNCIAS

A cirurgia de vasectomia é uma cirurgia de pequeno porte, mas está sujeita a intercorrências como qualquer cirurgia. Entre estas podemos subdividir em imediatas e tardias:

Intercorrências imediatas:

1- **Hematoma:** É o acúmulo de sangue na bolsa escrotal durante a cirurgia, o qual por drenagem gravitacional instala-se no subcutâneo da pele da bolsa escrotal e raiz do pênis. Este hematoma é indolor e desaparece em cerca de 7 dias

2- **Dor local :** No dia seguinte da cirurgia a região escrotal fica sensível aos grandes movimentos físicos, este desconforto dura de 2 a 3.

3- **Inchaço local:** Durante uma semana o paciente percebe um edema local em cada lado da bolsa escrotal com cerca de 1,0 a 1,5 cm, o que corresponde ao local da ligadura dos canais deferentes.

4- **Infecção local:** A infecção mais comum é a da pele, no local dos pontos. Estes caem sozinhos entre 7 a 10 dias após a vasectomia e em alguns casos após a queda dos pontos há uma deiscência (afastamento dos bordos da sutura) e isto leva a uma pequena infecção local cujo o tratamento é apenas manter o curativo até a completa cicatrização.

Mais raramente a infecção pode acometer o testículo e epidídimo, neste caso o tratamento deve incluir antibiótico e antiinflamatório por um período que varia de 10 a 21 dias e repouso.

Intercorrências tardias:

Dor Percistente: Cerca de 1 a 2% dos paciente vasectomizados apresentam uma dor na bolsa escrotal por um período que varia de 2 a 3 meses. É uma dor de pequena intensidade e no exame físico local está tudo bem. Esta dor é devido aos espermatozoides que ainda se encontram no epidídimo e testículo congestionando estes órgãos dando uma sensibilidade local a qual irá diminuindo lentamente com o correr do tempo.

Falha na Cirurgia: A cirurgia de vasectomia é uma cirurgia muito simples, mas esta sujeita a falhas devido a variações anatômicas do paciente, ou dificuldade técnicas ao se fazer a cirurgia. Esta falha, é facilmente diagnosticada pelo exame de espermograma, o qual não

se negativará após um período de 20 a 25 ejaculações. Uma outra possibilidade muito rara é a auto recanalização do canal deferente após a vasectomia.